

# Maximal Independent Set

## Algorithmen für verteilte Systeme

Sebastian Forster

Universität Salzburg



Dieses Werk steht unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

# Globale vs. lokale Probleme

## **Globale Probleme:**

- Benötigen  $\Omega(D)$  Runden
- Kürzeste Wege
- Minimum Spanning Tree

# Globale vs. lokale Probleme

## Globale Probleme:

- Benötigen  $\Omega(D)$  Runden
- Kürzeste Wege
- Minimum Spanning Tree

## Lokale Probleme:

- Laufzeit  $o(n)$
- Maximal Independent Set
- Maximal Matching
- Spanner-Berechnung

# Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie

- ① Union Bound
- ② Linearität des Erwartungswerts
- ③ Markov Bound
- ④ Chernoff Bound

# Union Bound und Erwartungswert

## Lemma (Union Bound)

*Seien  $A$  und  $B$  zwei Ereignisse. Dann gilt  $\Pr[A \cup B] \leq \Pr[A] + \Pr[B]$ .*

# Union Bound und Erwartungswert

## Lemma (Union Bound)

*Seien  $A$  und  $B$  zwei Ereignisse. Dann gilt  $\Pr[A \cup B] \leq \Pr[A] + \Pr[B]$ .*

Allgemein:  $\Pr[\bigcup_i A_i] \leq \sum_i \Pr[A_i]$

# Union Bound und Erwartungswert

## Lemma (Union Bound)

Seien  $A$  und  $B$  zwei Ereignisse. Dann gilt  $\Pr[A \cup B] \leq \Pr[A] + \Pr[B]$ .

Allgemein:  $\Pr[\bigcup_i A_i] \leq \sum_i \Pr[A_i]$

## Definition

Der **Erwartungswert** einer Zufallsvariable  $X$  ist  $\text{Ex}[X] = \sum_x x \cdot \Pr[X = x]$ .

Für binäre Zufallsvariablen  $X \in \{0, 1\}$  gilt:  $\text{Ex}[X] = \Pr[X = 1]$ .

# Union Bound und Erwartungswert

## Lemma (Union Bound)

Seien  $A$  und  $B$  zwei Ereignisse. Dann gilt  $\Pr[A \cup B] \leq \Pr[A] + \Pr[B]$ .

Allgemein:  $\Pr[\bigcup_i A_i] \leq \sum_i \Pr[A_i]$

## Definition

Der **Erwartungswert** einer Zufallsvariable  $X$  ist  $\text{Ex}[X] = \sum_x x \cdot \Pr[X = x]$ .

Für binäre Zufallsvariablen  $X \in \{0, 1\}$  gilt:  $\text{Ex}[X] = \Pr[X = 1]$ .

## Lemma (Linearität des Erwartungswerts)

Seien  $X$  und  $Y$  zwei Zufallsvariablen. Dann gilt  $\text{Ex}[X + Y] = \text{Ex}[X] + \text{Ex}[Y]$



# Union Bound und Erwartungswert

## Lemma (Union Bound)

Seien  $A$  und  $B$  zwei Ereignisse. Dann gilt  $\Pr[A \cup B] \leq \Pr[A] + \Pr[B]$ .

Allgemein:  $\Pr[\bigcup_i A_i] \leq \sum_i \Pr[A_i]$

## Definition

Der **Erwartungswert** einer Zufallsvariable  $X$  ist  $\text{Ex}[X] = \sum_x x \cdot \Pr[X = x]$ .

Für binäre Zufallsvariablen  $X \in \{0, 1\}$  gilt:  $\text{Ex}[X] = \Pr[X = 1]$ .

## Lemma (Linearität des Erwartungswerts)

Seien  $X$  und  $Y$  zwei Zufallsvariablen. Dann gilt  $\text{Ex}[X + Y] = \text{Ex}[X] + \text{Ex}[Y]$

Allgemein:  $\text{Ex}[\sum_i X_i] = \sum_i \text{Ex}[X_i]$

# Motivation Concentration Bounds

- Erwartungswert alleine oft nicht aussagekräftig genug

# Motivation Concentration Bounds

- Erwartungswert alleine oft nicht aussagekräftig genug
- Wie groß ist Wahrscheinlichkeit vom Erwartungswert um multiplikativen Faktor abzuweichen?

# Motivation Concentration Bounds

- Erwartungswert alleine oft nicht aussagekräftig genug
- Wie groß ist Wahrscheinlichkeit vom Erwartungswert um multiplikativen Faktor abzuweichen?
- Algorithmische Anwendung: Wie viele Wiederholungen nötig, um gewünschte Schranke für Wahrscheinlichkeit der Abweichung zu erhalten?

# Markov Bound

## Theorem (Markov Bound)


*Sei  $X$  eine nicht-negative Zufallsvariable und sei  $\alpha > 0$  beliebig. Dann gilt*

$$\Pr[X \geq \alpha \cdot \text{Ex}[X]] \leq \frac{1}{\alpha}.$$

# Binomialverteilung

$n$  Wiederholungen eines Bernoulli-Experiments:


- $\Pr[X_i = 1] = p$
- $\Pr[X_i = 0] = 1 - p$
- Verteilung von  $\sum_{i=1}^n X_i$ :



# Binomialverteilung

$n$  Wiederholungen eines Bernoulli-Experiments:


- $\Pr[X_i = 1] = p$
- $\Pr[X_i = 0] = 1 - p$
- Verteilung von  $\sum_{i=1}^n X_i$ :



# Binomialverteilung

$n$  Wiederholungen eines Bernoulli-Experiments:

- $\Pr[X_i = 1] = p$
- $\Pr[X_i = 0] = 1 - p$
- Verteilung von  $\sum_{i=1}^n X_i$ :






# Binomialverteilung

$n$  Wiederholungen eines Bernoulli-Experiments:


- $\Pr[X_i = 1] = p$
- $\Pr[X_i = 0] = 1 - p$
- Verteilung von  $\sum_{i=1}^n X_i$ :



# Binomialverteilung

$n$  Wiederholungen eines Bernoulli-Experiments:


- $\Pr[X_i = 1] = p$
- $\Pr[X_i = 0] = 1 - p$
- Verteilung von  $\sum_{i=1}^n X_i$ :



# Binomialverteilung

$n$  Wiederholungen eines Bernoulli-Experiments:


- $\Pr[X_i = 1] = p$
- $\Pr[X_i = 0] = 1 - p$
- Verteilung von  $\sum_{i=1}^n X_i$ :



# Binomialverteilung

$n$  Wiederholungen eines Bernoulli-Experiments:


- $\Pr[X_i = 1] = p$
- $\Pr[X_i = 0] = 1 - p$
- Verteilung von  $\sum_{i=1}^n X_i$ :



# Binomialverteilung

$n$  Wiederholungen eines Bernoulli-Experiments:


- $\Pr[X_i = 1] = p$
- $\Pr[X_i = 0] = 1 - p$
- Verteilung von  $\sum_{i=1}^n X_i$ :



# Binomialverteilung

$n$  Wiederholungen eines Bernoulli-Experiments:


- $\Pr[X_i = 1] = p$
- $\Pr[X_i = 0] = 1 - p$
- Verteilung von  $\sum_{i=1}^n X_i$ :



# Binomialverteilung

$n$  Wiederholungen eines Bernoulli-Experiments:


- $\Pr[X_i = 1] = p$
- $\Pr[X_i = 0] = 1 - p$
- Verteilung von  $\sum_{i=1}^n X_i$ :



# Binomialverteilung

$n$  Wiederholungen eines Bernoulli-Experiments:

- $\Pr[X_i = 1] = p$
- $\Pr[X_i = 0] = 1 - p$
- Verteilung von  $\sum_{i=1}^n X_i$ :






# Binomialverteilung

$n$  Wiederholungen eines Bernoulli-Experiments:

- $\Pr[X_i = 1] = p$
- $\Pr[X_i = 0] = 1 - p$
- Verteilung von  $\sum_{i=1}^n X_i$ :



# Chernoff Bound

## Theorem (Chernoff Bound (Upper Tail))

Seien  $X_1, \dots, X_n \in \{0, 1\}$  unabhängige binäre Zufallsvariablen mit  $\Pr[X_i = 1] \leq p$  und sei  $\mu := pn$ . Dann gilt Für jedes  $\delta > 0$ :

$$\Pr \left[ \sum_{i=1}^n X_i \geq (1 + \delta) \cdot \mu \right] \leq \frac{1}{e^{\frac{\min\{\delta, \delta^2\}}{3} \cdot \mu}}$$

## Theorem (Chernoff Bound (Lower Tail))

Seien  $X_1, \dots, X_n \in \{0, 1\}$  unabhängige binäre Zufallsvariablen mit  $\Pr[X_i = 1] \geq p$  und sei  $\mu := pn$ . Dann gilt für jedes  $\delta \in [0, 1]$ :

$$\Pr \left[ \sum_{i=1}^n X_i \leq (1 - \delta) \cdot \mu \right] \leq \frac{1}{e^{\frac{\delta^2}{2} \cdot \mu}}$$

Gibt insbesondere Schranken für Binomialverteilung!

# Maximal Independent Set

## Definition

In einem ungerichteten Graph  $G = (V, E)$  ist ein **Independent Set** eine Teilmenge von Knoten  $U \subseteq V$ , in der keine zwei Knoten benachbart sind.

# Maximal Independent Set

## Definition

In einem ungerichteten Graph  $G = (V, E)$  ist ein **Independent Set** eine Teilmenge von Knoten  $U \subseteq V$ , in der keine zwei Knoten benachbart sind.



- **Maximal** Independent Set: Es kann kein Knoten zu  $U$  hinzugefügt werden, so dass  $U$  immer noch ein Independent Set ist
- **Maximum** Independent Set:  $U$  hat größtmögliche Kardinalität unter allen Independent Sets

# Maximal Independent Set

## Definition

In einem ungerichteten Graph  $G = (V, E)$  ist ein **Independent Set** eine Teilmenge von Knoten  $U \subseteq V$ , in der keine zwei Knoten benachbart sind.

- **Maximal** Independent Set: Es kann kein Knoten zu  $U$  hinzugefügt werden, so dass  $U$  immer noch ein Independent Set ist
- **Maximum** Independent Set:  $U$  hat größtmögliche Kardinalität unter allen Independent Sets



# Sequentieller Algorithmus

## Greedy:

```
1  $U \leftarrow \emptyset$ 
2 foreach  $v \in V$  do
3   if  $\forall u \in U : (u, v) \notin E$  then
4      $U \leftarrow U \cup \{v\}$ 
```

# Sequentieller Algorithmus

## Greedy:

```
1  $U \leftarrow \emptyset$ 
2 foreach  $v \in V$  do
3   if  $\forall u \in U : (u, v) \notin E$  then
4      $U \leftarrow U \cup \{v\}$ 
```

**RAM Modell:** Geeignete Implementierung benötigt Zeit  $O(m + n)$

# Sequentieller Algorithmus

## Greedy:


```
1  $U \leftarrow \emptyset$ 
2 foreach  $v \in V$  do
3   if  $\forall u \in U : (u, v) \notin E$  then
4      $U \leftarrow U \cup \{v\}$ 
```

**RAM Modell:** Geeignete Implementierung benötigt Zeit  $O(m + n)$


**CONGEST Modell:** Benötigt im schlechtesten Fall  $\Omega(n)$  Runden




# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel



# Beispiel




# Beispiel







# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel



# Beispiel




# Beispiel







# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel



# Beispiel




# Beispiel







# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel



# Beispiel



# Beispiel



# Verteilter Algorithmus [Luby '85, Alon et al. '86, Métivier et al. '11]

**Ziel:** Jeder Knoten weiß, ob er in  $U$  ist oder nicht



## Verteilter Algorithmus [Luby '85, Alon et al. '86, Métivier et al. '11]

**Ziel:** Jeder Knoten weiß, ob er in  $U$  ist oder nicht

Jeder Knoten  $v$  führt folgenden Algorithmus aus:

- 1 **while**  $v$  nicht terminiert **do**
- 2     Wähle uniforme reelle Zufallszahl  $r(v) \in [0, 1[$
- 3     Sende  $r(v)$  an alle Nachbarn
- 4     Empfange  $r(u)$  von jedem Nachbar  $u$

## Verteilter Algorithmus [Luby '85, Alon et al. '86, Métivier et al. '11]

**Ziel:** Jeder Knoten weiß, ob er in  $U$  ist oder nicht

Jeder Knoten  $v$  führt folgenden Algorithmus aus:

```
1 while  $v$  nicht terminiert do
2   Wähle uniforme reelle Zufallszahl  $r(v) \in [0, 1[$ 
3   Sende  $r(v)$  an alle Nachbarn
4   Empfange  $r(u)$  von jedem Nachbar  $u$ 
5   if  $r(v) < r(u)$  für jeden Nachbar  $u$  then
6     Füge  $v$  zur Menge  $U$  hinzu
7     Benachrichtige Nachbarn, dass  $v \in U$ 
8     Terminiere  $v$ 
```


# Verteilter Algorithmus [Luby '85, Alon et al. '86, Métivier et al. '11]

**Ziel:** Jeder Knoten weiß, ob er in  $U$  ist oder nicht


Jeder Knoten  $v$  führt folgenden Algorithmus aus:

```
1 while  $v$  nicht terminiert do
2   Wähle uniforme reelle Zufallszahl  $r(v) \in [0, 1[$ 
3   Sende  $r(v)$  an alle Nachbarn
4   Empfange  $r(u)$  von jedem Nachbar  $u$ 
5   if  $r(v) < r(u)$  für jeden Nachbar  $u$  then
6     Füge  $v$  zur Menge  $U$  hinzu
7     Benachrichtige Nachbarn, dass  $v \in U$ 
8     Terminiere  $v$ 
9   Empfange Nachrichten über zu  $U$  hinzugefügte Nachbarn
10  if mindestens ein Nachbar wurde zu  $U$  hinzugefügt then
11  Terminiere  $v$ 
```


# Beispiel




# Beispiel




# Beispiel



# Beispiel




# Beispiel







# Beispiel




# Beispiel



# Beispiel



# Beispiel



# Korrektheit

# Korrektheit

$U$  ist Independent Set:

# Korrektheit

$U$  ist **Independent Set**:

- Induktion über Phasen (Iterationen der While-Schleife)

# Korrektheit

## $U$ ist Independent Set:

- Induktion über Phasen (Iterationen der While-Schleife)
- Induktionshypothese: Knoten in  $U$  sind Independent Set und Menge der terminierten Knoten besteht aus  $U$  und Nachbarn von  $U$



# Korrektheit

## $U$ ist Independent Set:

- Induktion über Phasen (Iterationen der While-Schleife)
- Induktionshypothese: Knoten in  $U$  sind Independent Set und Menge der terminierten Knoten besteht aus  $U$  und Nachbarn von  $U$
- Jeder Knoten, der zu  $U$  hinzugefügt wird, hat keine Nachbarn in  $U$  aus der aktuellen Phase und keine Nachbarn in  $U$  aus einer früheren Phase

# Korrektheit

## $U$ ist Independent Set:

- Induktion über Phasen (Iterationen der While-Schleife)
- Induktionshypothese: Knoten in  $U$  sind Independent Set und Menge der terminierten Knoten besteht aus  $U$  und Nachbarn von  $U$
- Jeder Knoten, der zu  $U$  hinzugefügt wird, hat keine Nachbarn in  $U$  aus der aktuellen Phase und keine Nachbarn in  $U$  aus einer früheren Phase

## Maximalität:

# Korrektheit

## $U$ ist Independent Set:

- Induktion über Phasen (Iterationen der While-Schleife)
- Induktionshypothese: Knoten in  $U$  sind Independent Set und Menge der terminierten Knoten besteht aus  $U$  und Nachbarn von  $U$
- Jeder Knoten, der zu  $U$  hinzugefügt wird, hat keine Nachbarn in  $U$  aus der aktuellen Phase und keine Nachbarn in  $U$  aus einer früheren Phase

## Maximalität:

- Knoten terminiert nur, wenn er selbst oder Nachbar in  $U$  ist

# Korrektheit

## $U$ ist Independent Set:

- Induktion über Phasen (Iterationen der While-Schleife)
- Induktionshypothese: Knoten in  $U$  sind Independent Set und Menge der terminierten Knoten besteht aus  $U$  und Nachbarn von  $U$
- Jeder Knoten, der zu  $U$  hinzugefügt wird, hat keine Nachbarn in  $U$  aus der aktuellen Phase und keine Nachbarn in  $U$  aus einer früheren Phase

## Maximalität:

- Knoten terminiert nur, wenn er selbst oder Nachbar in  $U$  ist
- Sobald alle Knoten terminiert sind, kann kein Knoten mehr hinzugefügt werden, ohne Independent Set Eigenschaft zu verletzen

# Korrektheit

## $U$ ist Independent Set:

- Induktion über Phasen (Iterationen der While-Schleife)
- Induktionshypothese: Knoten in  $U$  sind Independent Set und Menge der terminierten Knoten besteht aus  $U$  und Nachbarn von  $U$
- Jeder Knoten, der zu  $U$  hinzugefügt wird, hat keine Nachbarn in  $U$  aus der aktuellen Phase und keine Nachbarn in  $U$  aus einer früheren Phase

## Maximalität:

- Knoten terminiert nur, wenn er selbst oder Nachbar in  $U$  ist
- Sobald alle Knoten terminiert sind, kann kein Knoten mehr hinzugefügt werden, ohne Independent Set Eigenschaft zu verletzen

**Terminierung:** Mit Wahrscheinlichkeit 1

# Korrektheit

## $U$ ist Independent Set:

- Induktion über Phasen (Iterationen der While-Schleife)
- Induktionshypothese: Knoten in  $U$  sind Independent Set und Menge der terminierten Knoten besteht aus  $U$  und Nachbarn von  $U$
- Jeder Knoten, der zu  $U$  hinzugefügt wird, hat keine Nachbarn in  $U$  aus der aktuellen Phase und keine Nachbarn in  $U$  aus einer früheren Phase

## Maximalität:

- Knoten terminiert nur, wenn er selbst oder Nachbar in  $U$  ist
- Sobald alle Knoten terminiert sind, kann kein Knoten mehr hinzugefügt werden, ohne Independent Set Eigenschaft zu verletzen

## Terminierung: Mit Wahrscheinlichkeit 1

- Wahrscheinlichkeit, dass zwei zufällige reelle Zahlen gleich sind = 0

# Korrektheit

## $U$ ist Independent Set:

- Induktion über Phasen (Iterationen der While-Schleife)
- Induktionshypothese: Knoten in  $U$  sind Independent Set und Menge der terminierten Knoten besteht aus  $U$  und Nachbarn von  $U$
- Jeder Knoten, der zu  $U$  hinzugefügt wird, hat keine Nachbarn in  $U$  aus der aktuellen Phase und keine Nachbarn in  $U$  aus einer früheren Phase

## Maximalität:

- Knoten terminiert nur, wenn er selbst oder Nachbar in  $U$  ist
- Sobald alle Knoten terminiert sind, kann kein Knoten mehr hinzugefügt werden, ohne Independent Set Eigenschaft zu verletzen

## Terminierung: Mit Wahrscheinlichkeit 1

- Wahrscheinlichkeit, dass zwei zufällige reelle Zahlen gleich sind = 0
- Mit Union Bound: Wahrscheinlichkeit, dass Zufallszahlen in  $n$  Phasen unterschiedlich sind = 1

# Korrektheit

## $U$ ist Independent Set:

- Induktion über Phasen (Iterationen der While-Schleife)
- Induktionshypothese: Knoten in  $U$  sind Independent Set und Menge der terminierten Knoten besteht aus  $U$  und Nachbarn von  $U$
- Jeder Knoten, der zu  $U$  hinzugefügt wird, hat keine Nachbarn in  $U$  aus der aktuellen Phase und keine Nachbarn in  $U$  aus einer früheren Phase

## Maximalität:

- Knoten terminiert nur, wenn er selbst oder Nachbar in  $U$  ist
- Sobald alle Knoten terminiert sind, kann kein Knoten mehr hinzugefügt werden, ohne Independent Set Eigenschaft zu verletzen

## Terminierung: Mit Wahrscheinlichkeit 1

- Wahrscheinlichkeit, dass zwei zufällige reelle Zahlen gleich sind = 0
- Mit Union Bound: Wahrscheinlichkeit, dass Zufallszahlen in  $n$  Phasen unterschiedlich sind = 1
- In jeder Phase wird zumindest Knoten mit kleinstem Wert für  $r(v)$  der Menge  $U$  hinzugefügt



# Laufzeitanalyse

## Strategie:

- Analysiere Reduktion der Anzahl an Kanten im von nicht-terminierten Knoten induzierten Subgraph

## Strategie:

- Analysiere Reduktion der Anzahl an Kanten im von nicht-terminierten Knoten induzierten Subgraph
- Zeige: In jeder Phase wird die Anzahl der Kanten in Erwartung um (mindestens) die Hälfte reduziert


## Strategie:

- Analysiere Reduktion der Anzahl an Kanten im von nicht-terminierten Knoten induzierten Subgraph
- Zeige: In jeder Phase wird die Anzahl der Kanten in Erwartung um (mindestens) die Hälfte reduziert
- Anwendung von Chernoff und Markov Bound:  $O(\log n)$  Phasen  
Jede Phase dauert  $O(1)$  Runden  $\Rightarrow O(\log n)$  Runden

## Strategie:

- Analysiere Reduktion der Anzahl an Kanten im von nicht-terminierten Knoten induzierten Subgraph
- Zeige: In jeder Phase wird die Anzahl der Kanten in Erwartung um (mindestens) die Hälfte reduziert
- Anwendung von Chernoff und Markov Bound:  $O(\log n)$  Phasen  
Jede Phase dauert  $O(1)$  Runden  $\Rightarrow O(\log n)$  Runden
- Implementierungsdetail: Übertragung von  $O(\log n)$  Bits der reellen Zufallszahlen

## Subgraph nicht-terminierter Knoten



# Erwartungswert

## **Analysetrick:**

- Betrachte jede Kante als zwei gerichtete Kanten
- Systematische Unterschätzung entfernter Kanten erleichtert Analyse

# Erwartungswert

## Analysetrick:

- Betrachte jede Kante als zwei gerichtete Kanten
- Systematische Unterschätzung entfernter Kanten erleichtert Analyse

$u$  **dominiert** Nachbar  $v$  ( $u \rightarrow v$ ) falls

- 1  $r(u) < r(u')$  für alle Nachbarn  $u'$  von  $u$  und

# Erwartungswert

## Analysetrick:

- Betrachte jede Kante als zwei gerichtete Kanten
- Systematische Unterschätzung entfernter Kanten erleichtert Analyse

$u$  **dominiert** Nachbar  $v$  ( $u \rightarrow v$ ) falls

- 1  $r(u) < r(u')$  für alle Nachbarn  $u'$  von  $u$  und
- 2  $r(u) < r(v')$  für alle Nachbarn  $v' \neq u$  von  $v$



# Erwartungswert

## Analysetrick:

- Betrachte jede Kante als zwei gerichtete Kanten
- Systematische Unterschätzung entfernter Kanten erleichtert Analyse

$u$  **dominiert** Nachbar  $v$  ( $u \rightarrow v$ ) falls

- 1  $r(u) < r(u')$  für alle Nachbarn  $u'$  von  $u$  und
- 2  $r(u) < r(v')$  für alle Nachbarn  $v' \neq u$  von  $v$

**Idee:** Wenn  $u \rightarrow v$ , dann können die entfernten ausgehende Kanten von  $v$  eindeutig  $u$  zugerechnet werden

# Erwartungswert

## Analysetrick:

- Betrachte jede Kante als zwei gerichtete Kanten
- Systematische Unterschätzung entfernter Kanten erleichtert Analyse

$u$  **dominiert** Nachbar  $v$  ( $u \rightarrow v$ ) falls

- 1  $r(u) < r(u')$  für alle Nachbarn  $u'$  von  $u$  und
- 2  $r(u) < r(v')$  für alle Nachbarn  $v' \neq u$  von  $v$

**Idee:** Wenn  $u \rightarrow v$ , dann können die entfernten ausgehende Kanten von  $v$  eindeutig  $u$  zugerechnet werden

$$\Pr[u \rightarrow v] \geq \frac{1}{\deg(u) + \deg(v)}$$

# Erwartungswert

## Analysetrick:

- Betrachte jede Kante als zwei gerichtete Kanten
- Systematische Unterschätzung entfernter Kanten erleichtert Analyse

$u$  **dominiert** Nachbar  $v$  ( $u \rightarrow v$ ) falls

- 1  $r(u) < r(u')$  für alle Nachbarn  $u'$  von  $u$  und
- 2  $r(u) < r(v')$  für alle Nachbarn  $v' \neq u$  von  $v$

**Idee:** Wenn  $u \rightarrow v$ , dann können die entfernten ausgehende Kanten von  $v$  eindeutig  $u$  zugerechnet werden

$$\Pr[u \rightarrow v] \geq \frac{1}{\deg(u) + \deg(v)}$$

## Begründung:

- Anzahl Knoten in Nachbarschaften von  $u$  und  $v$ :  $\leq \deg(u) + \deg(v)$

# Erwartungswert

## Analysetrick:

- Betrachte jede Kante als zwei gerichtete Kanten
- Systematische Unterschätzung entfernter Kanten erleichtert Analyse

$u$  **dominiert** Nachbar  $v$  ( $u \rightarrow v$ ) falls

- 1  $r(u) < r(u')$  für alle Nachbarn  $u'$  von  $u$  und
- 2  $r(u) < r(v')$  für alle Nachbarn  $v' \neq u$  von  $v$

**Idee:** Wenn  $u \rightarrow v$ , dann können die entfernten ausgehende Kanten von  $v$  eindeutig  $u$  zugerechnet werden

$$\Pr[u \rightarrow v] \geq \frac{1}{\deg(u) + \deg(v)}$$

## Begründung:

- Anzahl Knoten in Nachbarschaften von  $u$  und  $v$ :  $\leq \deg(u) + \deg(v)$
- Zufallszahlen  $r(\cdot)$  induzieren uniform zufällige Permutation von  $V$

# Erwartungswert

## Analysetrick:

- Betrachte jede Kante als zwei gerichtete Kanten
- Systematische Unterschätzung entfernter Kanten erleichtert Analyse

$u$  **dominiert** Nachbar  $v$  ( $u \rightarrow v$ ) falls

- 1  $r(u) < r(u')$  für alle Nachbarn  $u'$  von  $u$  und
- 2  $r(u) < r(v')$  für alle Nachbarn  $v' \neq u$  von  $v$

**Idee:** Wenn  $u \rightarrow v$ , dann können die entfernten ausgehende Kanten von  $v$  eindeutig  $u$  zugerechnet werden

$$\Pr[u \rightarrow v] \geq \frac{1}{\deg(u) + \deg(v)}$$

## Begründung:

- Anzahl Knoten in Nachbarschaften von  $u$  und  $v$ :  $\leq \deg(u) + \deg(v)$
- Zufallszahlen  $r(\cdot)$  induzieren uniform zufällige Permutation von  $V$
- Wahrscheinlichkeit dass  $u$  erster in Permutation ist:  $1/\#\text{Knoten}$

## Erwartungswert (Fortsetzung)

$F$ : Menge ungerichteter Kanten am Beginn der aktuellen Phase

$X$ : Zufallsvariable für Anzahl entfernter *gerichteter* Kanten

## Erwartungswert (Fortsetzung)

$F$ : Menge ungerichteter Kanten am Beginn der aktuellen Phase

$X$ : Zufallsvariable für Anzahl entfernter *gerichteter* Kanten

$X_{(u \rightarrow v)} = \#$  ausgehender Kanten von  $v$ , die wegen  $u \rightarrow v$  entfernt werden

## Erwartungswert (Fortsetzung)

$F$ : Menge ungerichteter Kanten am Beginn der aktuellen Phase

$X$ : Zufallsvariable für Anzahl entfernter *gerichteter* Kanten

$X_{(u \rightarrow v)}$  = # ausgehender Kanten von  $v$ , die wegen  $u \rightarrow v$  entfernt werden

$$\text{Ex}[X] \geq \sum_{\{u,v\} \in F} (\text{Ex}[X_{(u \rightarrow v)}] + \text{Ex}[X_{(v \rightarrow u)}])$$



## Erwartungswert (Fortsetzung)

$F$ : Menge ungerichteter Kanten am Beginn der aktuellen Phase

$X$ : Zufallsvariable für Anzahl entfernter *gerichteter* Kanten

$X_{(u \rightarrow v)}$  = # ausgehender Kanten von  $v$ , die wegen  $u \rightarrow v$  entfernt werden

$$\begin{aligned} \text{Ex}[X] &\geq \sum_{\{u,v\} \in F} (\text{Ex}[X_{(u \rightarrow v)}] + \text{Ex}[X_{(v \rightarrow u)}]) \\ &= \sum_{\{u,v\} \in F} (\text{Pr}[u \rightarrow v] \cdot \text{deg}(v) + \text{Pr}[v \rightarrow u] \cdot \text{deg}(u)) \end{aligned}$$

## Erwartungswert (Fortsetzung)

$F$ : Menge ungerichteter Kanten am Beginn der aktuellen Phase

$X$ : Zufallsvariable für Anzahl entfernter *gerichteter* Kanten

$X_{(u \rightarrow v)}$  = # ausgehender Kanten von  $v$ , die wegen  $u \rightarrow v$  entfernt werden

$$\begin{aligned} \text{Ex}[X] &\geq \sum_{\{u,v\} \in F} (\text{Ex}[X_{(u \rightarrow v)}] + \text{Ex}[X_{(v \rightarrow u)}]) \\ &= \sum_{\{u,v\} \in F} (\text{Pr}[u \rightarrow v] \cdot \text{deg}(v) + \text{Pr}[v \rightarrow u] \cdot \text{deg}(u)) \\ &\geq \sum_{\{u,v\} \in F} \left( \frac{\text{deg}(v)}{\text{deg}(u) + \text{deg}(v)} + \frac{\text{deg}(u)}{\text{deg}(v) + \text{deg}(u)} \right) \end{aligned}$$

## Erwartungswert (Fortsetzung)

$F$ : Menge ungerichteter Kanten am Beginn der aktuellen Phase

$X$ : Zufallsvariable für Anzahl entfernter *gerichteter* Kanten

$X_{(u \rightarrow v)}$  = # ausgehender Kanten von  $v$ , die wegen  $u \rightarrow v$  entfernt werden

$$\begin{aligned} \text{Ex}[X] &\geq \sum_{\{u,v\} \in F} (\text{Ex}[X_{(u \rightarrow v)}] + \text{Ex}[X_{(v \rightarrow u)}]) \\ &= \sum_{\{u,v\} \in F} (\text{Pr}[u \rightarrow v] \cdot \text{deg}(v) + \text{Pr}[v \rightarrow u] \cdot \text{deg}(u)) \\ &\geq \sum_{\{u,v\} \in F} \left( \frac{\text{deg}(v)}{\text{deg}(u) + \text{deg}(v)} + \frac{\text{deg}(u)}{\text{deg}(v) + \text{deg}(u)} \right) \\ &= \sum_{\{u,v\} \in F} 1 = |F| \end{aligned}$$

## Erwartungswert (Fortsetzung)

$F$ : Menge ungerichteter Kanten am Beginn der aktuellen Phase

$X$ : Zufallsvariable für Anzahl entfernter *gerichteter* Kanten

$X_{(u \rightarrow v)}$  = # ausgehender Kanten von  $v$ , die wegen  $u \rightarrow v$  entfernt werden

$$\begin{aligned} \text{Ex}[X] &\geq \sum_{\{u,v\} \in F} (\text{Ex}[X_{(u \rightarrow v)}] + \text{Ex}[X_{(v \rightarrow u)}]) \\ &= \sum_{\{u,v\} \in F} (\text{Pr}[u \rightarrow v] \cdot \text{deg}(v) + \text{Pr}[v \rightarrow u] \cdot \text{deg}(u)) \\ &\geq \sum_{\{u,v\} \in F} \left( \frac{\text{deg}(v)}{\text{deg}(u) + \text{deg}(v)} + \frac{\text{deg}(u)}{\text{deg}(v) + \text{deg}(u)} \right) \\ &= \sum_{\{u,v\} \in F} 1 = |F| \end{aligned}$$

Es werden mindestens halb so viele *ungerichtete* Kanten entfernt!

## Erwartungswert (Fortsetzung)

$F$ : Menge ungerichteter Kanten am Beginn der aktuellen Phase

$X$ : Zufallsvariable für Anzahl entfernter *gerichteter* Kanten

$X_{(u \rightarrow v)}$  = # ausgehender Kanten von  $v$ , die wegen  $u \rightarrow v$  entfernt werden

$$\begin{aligned} \text{Ex}[X] &\geq \sum_{\{u,v\} \in F} (\text{Ex}[X_{(u \rightarrow v)}] + \text{Ex}[X_{(v \rightarrow u)}]) \\ &= \sum_{\{u,v\} \in F} (\text{Pr}[u \rightarrow v] \cdot \text{deg}(v) + \text{Pr}[v \rightarrow u] \cdot \text{deg}(u)) \\ &\geq \sum_{\{u,v\} \in F} \left( \frac{\text{deg}(v)}{\text{deg}(u) + \text{deg}(v)} + \frac{\text{deg}(u)}{\text{deg}(v) + \text{deg}(u)} \right) \\ &= \sum_{\{u,v\} \in F} 1 = |F| \end{aligned}$$

Es werden mindestens halb so viele *ungerichtete* Kanten entfernt!

### Lemma

*In jeder Phase wird in Erwartung mindestens die Hälfte der Kanten entfernt.*

# Markov Bound

## Theorem (Markov Bound)

*Sei  $X$  eine nicht-negative Zufallsvariable und  $\alpha > 0$ . Dann gilt*

$$\Pr[X \geq \alpha \cdot \text{Ex}[X]] \leq \frac{1}{\alpha}.$$

# Markov Bound

## Theorem (Markov Bound)

*Sei  $X$  eine nicht-negative Zufallsvariable und  $\alpha > 0$ . Dann gilt*

$$\Pr[X \geq \alpha \cdot \text{Ex}[X]] \leq \frac{1}{\alpha}.$$

Sei  $Y$  Zufallsvariable für Anzahl der nicht-entfernten Kanten

# Markov Bound

## Theorem (Markov Bound)

Sei  $X$  eine nicht-negative Zufallsvariable und  $\alpha > 0$ . Dann gilt

$$\Pr[X \geq \alpha \cdot \text{Ex}[X]] \leq \frac{1}{\alpha}.$$

Sei  $Y$  Zufallsvariable für Anzahl der nicht-entfernten Kanten

Wir wissen:  $\text{Ex}[Y] \leq \frac{|F|}{2}$



# Markov Bound

## Theorem (Markov Bound)

Sei  $X$  eine nicht-negative Zufallsvariable und  $\alpha > 0$ . Dann gilt

$$\Pr[X \geq \alpha \cdot \text{Ex}[X]] \leq \frac{1}{\alpha}.$$

Sei  $Y$  Zufallsvariable für Anzahl der nicht-entfernten Kanten

Wir wissen:  $\text{Ex}[Y] \leq \frac{|F|}{2}$

Wegen Markov Bound mit  $\alpha = \frac{4}{3}$ :

$$\Pr\left[Y \geq \frac{2}{3} \cdot |F|\right] \leq \Pr\left[Y \geq \frac{4}{3} \cdot \text{Ex}[Y]\right] \leq \frac{3}{4}$$

# Markov Bound

## Theorem (Markov Bound)

Sei  $X$  eine nicht-negative Zufallsvariable und  $\alpha > 0$ . Dann gilt

$$\Pr[X \geq \alpha \cdot \text{Ex}[X]] \leq \frac{1}{\alpha}.$$

Sei  $Y$  Zufallsvariable für Anzahl der nicht-entfernten Kanten

Wir wissen:  $\text{Ex}[Y] \leq \frac{|F|}{2}$

Wegen Markov Bound mit  $\alpha = \frac{4}{3}$ :

$$\Pr\left[Y \geq \frac{2}{3} \cdot |F|\right] \leq \Pr\left[Y \geq \frac{4}{3} \cdot \text{Ex}[Y]\right] \leq \frac{3}{4}$$

Gegenereignis:

$$\Pr\left[Y < \frac{2}{3} \cdot |F|\right] = 1 - \Pr\left[Y \geq \frac{2}{3} \cdot |F|\right] \geq 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

# Markov Bound

## Theorem (Markov Bound)

Sei  $X$  eine nicht-negative Zufallsvariable und  $\alpha > 0$ . Dann gilt

$$\Pr[X \geq \alpha \cdot \text{Ex}[X]] \leq \frac{1}{\alpha}.$$

Sei  $Y$  Zufallsvariable für Anzahl der nicht-entfernten Kanten

Wir wissen:  $\text{Ex}[Y] \leq \frac{|F|}{2}$

Wegen Markov Bound mit  $\alpha = \frac{4}{3}$ :

$$\Pr\left[Y \geq \frac{2}{3} \cdot |F|\right] \leq \Pr\left[Y \geq \frac{4}{3} \cdot \text{Ex}[Y]\right] \leq \frac{3}{4}$$

Gegenereignis:

$$\Pr\left[Y < \frac{2}{3} \cdot |F|\right] = 1 - \Pr\left[Y \geq \frac{2}{3} \cdot |F|\right] \geq 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

## Lemma

In jeder Phase wird mit Wahrscheinlichkeit  $\geq \frac{1}{4}$  mindestens ein Drittel der Kanten entfernt.

# Chernoff Bound

## Chernoff Bound

Seien  $Z_1, \dots, Z_\ell$  *unabhängige* binäre Zufallsvariablen mit  $\Pr[Z_i = 1] = p$  und  $\Pr[Z_i = 0] = 1 - p$  (und somit  $\mu := \text{Ex}[\sum_{i=1}^{\ell} Z_i] = p\ell$ ). Dann gilt für jedes  $\delta \in [0, 1]$ :

$$\Pr \left[ \sum_{i=1}^{\ell} Z_i \leq (1 - \delta) \cdot \mu \right] \leq \frac{1}{e^{\frac{\delta^2}{2} \mu}}$$

# Anzahl Phasen I

## Lemma

*Mit hoher Wahrscheinlichkeit terminiert der verteilte Maximal Independent Set Algorithmus in  $\leq 72 \lceil c \ln n \rceil$  Phasen.*

# Anzahl Phasen I

## Lemma

*Mit hoher Wahrscheinlichkeit terminiert der verteilte Maximal Independent Set Algorithmus in  $\leq 72 \lceil c \ln n \rceil$  Phasen.*

### **Beweis:**

Idee: Unterteile in gute und schlechte Phasen, binäre Zufallsvariable

$$Z_i = \begin{cases} 1 & \text{falls in Phase } i \text{ mindestens } 1/3 \text{ der Kanten entfernt werden} \\ 0 & \text{andernfalls} \end{cases}$$

# Anzahl Phasen I

## Lemma

*Mit hoher Wahrscheinlichkeit terminiert der verteilte Maximal Independent Set Algorithmus in  $\leq 72 \lceil c \ln n \rceil$  Phasen.*

### **Beweis:**

Idee: Unterteile in gute und schlechte Phasen, binäre Zufallsvariable

$$Z_i = \begin{cases} 1 & \text{falls in Phase } i \text{ mindestens } 1/3 \text{ der Kanten entfernt werden} \\ 0 & \text{andernfalls} \end{cases}$$

$Z = \sum_{i=1}^{72 \lceil c \ln n \rceil} Z_i$  ist Zufallsvariable für Anzahl guter Phasen (mit  $Z_i = 1$ )

# Anzahl Phasen I

## Lemma

*Mit hoher Wahrscheinlichkeit terminiert der verteilte Maximal Independent Set Algorithmus in  $\leq 72 \lceil c \ln n \rceil$  Phasen.*

### **Beweis:**

Idee: Unterteile in gute und schlechte Phasen, binäre Zufallsvariable

$$Z_i = \begin{cases} 1 & \text{falls in Phase } i \text{ mindestens } 1/3 \text{ der Kanten entfernt werden} \\ 0 & \text{andernfalls} \end{cases}$$

$Z = \sum_{i=1}^{72 \lceil c \ln n \rceil} Z_i$  ist Zufallsvariable für Anzahl guter Phasen (mit  $Z_i = 1$ )

Mit  $p := \frac{1}{4}$  gilt  $\Pr[Z_i = 1] \geq \frac{1}{4} = p$



## Anzahl Phasen II

### Lemma

*Mit hoher Wahrscheinlichkeit terminiert der verteilte Maximal Independent Set Algorithmus in  $\leq 72 \lceil c \ln n \rceil$  Phasen.*

### **Beweis (Fortsetzung):**

Nach  $k$  guten Phasen: #Kanten  $\leq (\frac{2}{3})^k m \leq (\frac{2}{3})^k n^2$

## Anzahl Phasen II

### Lemma

*Mit hoher Wahrscheinlichkeit terminiert der verteilte Maximal Independent Set Algorithmus in  $\leq 72 \lceil c \ln n \rceil$  Phasen.*

### **Beweis (Fortsetzung):**

Nach  $k$  guten Phasen: #Kanten  $\leq (\frac{2}{3})^k m \leq (\frac{2}{3})^k n^2$

$\Rightarrow$  Für #Kanten  $< 1$  werden  $\log_{3/2}(n^2) + 1$  gute Phasen benötigt

## Anzahl Phasen II

### Lemma

*Mit hoher Wahrscheinlichkeit terminiert der verteilte Maximal Independent Set Algorithmus in  $\leq 72 \lceil c \ln n \rceil$  Phasen.*

### **Beweis (Fortsetzung):**

Nach  $k$  guten Phasen: #Kanten  $\leq (\frac{2}{3})^k m \leq (\frac{2}{3})^k n^2$

$\Rightarrow$  Für #Kanten  $< 1$  werden  $\log_{3/2}(n^2) + 1$  gute Phasen benötigt

Chernoff-Bound für Gegenwahrscheinlichkeit (d.h. weniger gute Phasen)

Setze  $\mu := p \cdot 72 \lceil c \ln n \rceil = 18 \lceil c \ln n \rceil$  und  $\delta := \frac{1}{3}$ :

## Anzahl Phasen II

### Lemma

*Mit hoher Wahrscheinlichkeit terminiert der verteilte Maximal Independent Set Algorithmus in  $\leq 72 \lceil c \ln n \rceil$  Phasen.*

### Beweis (Fortsetzung):

Nach  $k$  guten Phasen: #Kanten  $\leq (\frac{2}{3})^k m \leq (\frac{2}{3})^k n^2$

$\Rightarrow$  Für #Kanten  $< 1$  werden  $\log_{3/2}(n^2) + 1$  gute Phasen benötigt

Chernoff-Bound für Gegenwahrscheinlichkeit (d.h. weniger gute Phasen)

Setze  $\mu := p \cdot 72 \lceil c \ln n \rceil = 18 \lceil c \ln n \rceil$  und  $\delta := \frac{1}{3}$ :

$$\Pr[Z \leq \log_{3/2}(n^2)] \leq \Pr[Z \leq (1 - \frac{1}{3})\mu]$$

## Anzahl Phasen II

### Lemma

*Mit hoher Wahrscheinlichkeit terminiert der verteilte Maximal Independent Set Algorithmus in  $\leq 72 \lceil c \ln n \rceil$  Phasen.*

### Beweis (Fortsetzung):

Nach  $k$  guten Phasen: #Kanten  $\leq (\frac{2}{3})^k m \leq (\frac{2}{3})^k n^2$

$\Rightarrow$  Für #Kanten  $< 1$  werden  $\log_{3/2}(n^2) + 1$  gute Phasen benötigt

Chernoff-Bound für Gegenwahrscheinlichkeit (d.h. weniger gute Phasen)

Setze  $\mu := p \cdot 72 \lceil c \ln n \rceil = 18 \lceil c \ln n \rceil$  und  $\delta := \frac{1}{3}$ :

$$\Pr[Z \leq \log_{3/2}(n^2)] \leq \Pr[Z \leq (1 - \frac{1}{3})\mu]$$

1. Ungleichung:  $\log_{3/2}(n^2) \leq \frac{2 \ln n}{\ln(3/2)} \leq 6 \ln n \leq (1 - \frac{1}{3})18c \ln n = (1 - \frac{1}{3})\mu$

## Anzahl Phasen II

### Lemma

Mit hoher Wahrscheinlichkeit terminiert der verteilte Maximal Independent Set Algorithmus in  $\leq 72 \lceil c \ln n \rceil$  Phasen.

### Beweis (Fortsetzung):

Nach  $k$  guten Phasen: #Kanten  $\leq (\frac{2}{3})^k m \leq (\frac{2}{3})^k n^2$

$\Rightarrow$  Für #Kanten  $< 1$  werden  $\log_{3/2}(n^2) + 1$  gute Phasen benötigt

Chernoff-Bound für Gegenwahrscheinlichkeit (d.h. weniger gute Phasen)

Setze  $\mu := p \cdot 72 \lceil c \ln n \rceil = 18 \lceil c \ln n \rceil$  und  $\delta := \frac{1}{3}$ :

$$\Pr[Z \leq \log_{3/2}(n^2)] \leq \Pr[Z \leq (1 - \frac{1}{3})\mu] \leq \frac{1}{e^{\frac{\delta^2}{2} \cdot \mu}} = \frac{1}{e^{\mu/18}}$$

1. Ungleichung:  $\log_{3/2}(n^2) \leq \frac{2 \ln n}{\ln(3/2)} \leq 6 \ln n \leq (1 - \frac{1}{3})18c \ln n = (1 - \frac{1}{3})\mu$

## Anzahl Phasen II

### Lemma

Mit hoher Wahrscheinlichkeit terminiert der verteilte Maximal Independent Set Algorithmus in  $\leq 72 \lceil c \ln n \rceil$  Phasen.

### Beweis (Fortsetzung):

Nach  $k$  guten Phasen: #Kanten  $\leq (\frac{2}{3})^k m \leq (\frac{2}{3})^k n^2$

$\Rightarrow$  Für #Kanten  $< 1$  werden  $\log_{3/2}(n^2) + 1$  gute Phasen benötigt

Chernoff-Bound für Gegenwahrscheinlichkeit (d.h. weniger gute Phasen)

Setze  $\mu := p \cdot 72 \lceil c \ln n \rceil = 18 \lceil c \ln n \rceil$  und  $\delta := \frac{1}{3}$ :

$$\Pr[Z \leq \log_{3/2}(n^2)] \leq \Pr\left[Z \leq \left(1 - \frac{1}{3}\right)\mu\right] \leq \frac{1}{e^{\frac{\delta^2}{2} \cdot \mu}} = \frac{1}{e^{\mu/18}} \leq \frac{1}{e^{c \ln n}}$$

1. Ungleichung:  $\log_{3/2}(n^2) \leq \frac{2 \ln n}{\ln(3/2)} \leq 6 \ln n \leq \left(1 - \frac{1}{3}\right) 18c \ln n = \left(1 - \frac{1}{3}\right)\mu$

## Anzahl Phasen II

### Lemma

Mit hoher Wahrscheinlichkeit terminiert der verteilte Maximal Independent Set Algorithmus in  $\leq 72 \lceil c \ln n \rceil$  Phasen.

### Beweis (Fortsetzung):

Nach  $k$  guten Phasen: #Kanten  $\leq (\frac{2}{3})^k m \leq (\frac{2}{3})^k n^2$

$\Rightarrow$  Für #Kanten  $< 1$  werden  $\log_{3/2}(n^2) + 1$  gute Phasen benötigt

Chernoff-Bound für Gegenwahrscheinlichkeit (d.h. weniger gute Phasen)

Setze  $\mu := p \cdot 72 \lceil c \ln n \rceil = 18 \lceil c \ln n \rceil$  und  $\delta := \frac{1}{3}$ :

$$\Pr[Z \leq \log_{3/2}(n^2)] \leq \Pr\left[Z \leq \left(1 - \frac{1}{3}\right)\mu\right] \leq \frac{1}{e^{\frac{\delta^2}{2} \cdot \mu}} = \frac{1}{e^{\mu/18}} \leq \frac{1}{e^{c \ln n}} = \frac{1}{n^c}$$

1. Ungleichung:  $\log_{3/2}(n^2) \leq \frac{2 \ln n}{\ln(3/2)} \leq 6 \ln n \leq \left(1 - \frac{1}{3}\right) 18c \ln n = \left(1 - \frac{1}{3}\right)\mu$



# Bandbreitenbeschränkung

**Ziel:** Für jede Kante  $\{u, v\}$ , entscheide, ob  $r(u) < r(v)$  oder  $r(u) > r(v)$

# Bandbreitenbeschränkung

**Ziel:** Für jede Kante  $\{u, v\}$ , entscheide, ob  $r(u) < r(v)$  oder  $r(u) > r(v)$

Zufällige reelle Zahl  $\in [0, 1[$  (: unendlicher String zufälliger Bits

# Bandbreitenbeschränkung

**Ziel:** Für jede Kante  $\{u, v\}$ , entscheide, ob  $r(u) < r(v)$  oder  $r(u) > r(v)$

Zufällige reelle Zahl  $\in [0, 1[$  (: unendlicher String zufälliger Bits)

**Idee:**  $u$  und  $v$  tauschen nur die ersten  $(c + 3)\lceil \log n \rceil$  Bits aus

# Bandbreitenbeschränkung

**Ziel:** Für jede Kante  $\{u, v\}$ , entscheide, ob  $r(u) < r(v)$  oder  $r(u) > r(v)$

Zufällige reelle Zahl  $\in [0, 1[$  (: unendlicher String zufälliger Bits)

**Idee:**  $u$  und  $v$  tauschen nur die ersten  $(c + 3)\lceil \log n \rceil$  Bits aus

Wahrscheinlichkeit, dass die ersten  $(c + 3)\lceil \log n \rceil$  Bits gleich sind:

# Bandbreitenbeschränkung

**Ziel:** Für jede Kante  $\{u, v\}$ , entscheide, ob  $r(u) < r(v)$  oder  $r(u) > r(v)$

Zufällige reelle Zahl  $\in [0, 1]$  (: unendlicher String zufälliger Bits)

**Idee:**  $u$  und  $v$  tauschen nur die ersten  $(c + 3)\lceil \log n \rceil$  Bits aus

Wahrscheinlichkeit, dass die ersten  $(c + 3)\lceil \log n \rceil$  Bits gleich sind:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{(c+3)\lceil \log n \rceil}$$

# Bandbreitenbeschränkung

**Ziel:** Für jede Kante  $\{u, v\}$ , entscheide, ob  $r(u) < r(v)$  oder  $r(u) > r(v)$

Zufällige reelle Zahl  $\in [0, 1)$  (: unendlicher String zufälliger Bits)

**Idee:**  $u$  und  $v$  tauschen nur die ersten  $(c + 3)\lceil \log n \rceil$  Bits aus

Wahrscheinlichkeit, dass die ersten  $(c + 3)\lceil \log n \rceil$  Bits gleich sind:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{(c+3)\lceil \log n \rceil} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{(c+3)\log n} = \frac{1}{n^{c+3}}$$

# Bandbreitenbeschränkung

**Ziel:** Für jede Kante  $\{u, v\}$ , entscheide, ob  $r(u) < r(v)$  oder  $r(u) > r(v)$

Zufällige reelle Zahl  $\in [0, 1]$  (unendlicher String zufälliger Bits)

**Idee:**  $u$  und  $v$  tauschen nur die ersten  $(c + 3)\lceil \log n \rceil$  Bits aus

Wahrscheinlichkeit, dass die ersten  $(c + 3)\lceil \log n \rceil$  Bits gleich sind:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{(c+3)\lceil \log n \rceil} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{(c+3)\log n} = \frac{1}{n^{c+3}}$$

## Union Bound:

Wahrscheinlichkeit, dass für irgendeines der  $\leq n^2$  Paare in den  $\leq n$  Phasen des Algorithmus die ersten  $(c + 3)\lceil \log n \rceil$  Bits gleich sind:  $\leq n^2 \cdot \frac{1}{n^{c+3}} = \frac{1}{n^c}$

# Bandbreitenbeschränkung

**Ziel:** Für jede Kante  $\{u, v\}$ , entscheide, ob  $r(u) < r(v)$  oder  $r(u) > r(v)$

Zufällige reelle Zahl  $\in [0, 1]$  (: unendlicher String zufälliger Bits)

**Idee:**  $u$  und  $v$  tauschen nur die ersten  $(c + 3)\lceil \log n \rceil$  Bits aus

Wahrscheinlichkeit, dass die ersten  $(c + 3)\lceil \log n \rceil$  Bits gleich sind:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{(c+3)\lceil \log n \rceil} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{(c+3)\log n} = \frac{1}{n^{c+3}}$$

## Union Bound:

Wahrscheinlichkeit, dass für irgendeines der  $\leq n^2$  Paare in den  $\leq n$  Phasen des Algorithmus die ersten  $(c + 3)\lceil \log n \rceil$  Bits gleich sind:  $\leq n^2 \cdot \frac{1}{n^{c+3}} = \frac{1}{n^c}$

**Somit:** Bandbreite  $O(\log n)$  ist ausreichend



# Robustheit der „hohen Wahrscheinlichkeit“

## Definition

Ein Ereignis findet **mit hoher Wahrscheinlichkeit** statt, wenn es mit Wahrscheinlichkeit mindestens  $1 - \frac{1}{n^c}$ , für eine beliebig vorgegebene Konstante  $c \geq 1$ , stattfindet.

# Robustheit der „hohen Wahrscheinlichkeit“

## Definition

Ein Ereignis findet **mit hoher Wahrscheinlichkeit** statt, wenn es mit Wahrscheinlichkeit mindestens  $1 - \frac{1}{n^c}$ , für eine beliebig vorgegebene Konstante  $c \geq 1$ , stattfindet.

→ In der Regel hängt die in der  $O$ -Notation verborgene Konstante von  $c$  ab

# Robustheit der „hohen Wahrscheinlichkeit“

## Definition

Ein Ereignis findet **mit hoher Wahrscheinlichkeit** statt, wenn es mit Wahrscheinlichkeit mindestens  $1 - \frac{1}{n^c}$ , für eine beliebig vorgegebene Konstante  $c \geq 1$ , stattfindet.

→ In der Regel hängt die in der  $O$ -Notation verborgene Konstante von  $c$  ab

**Beispiel:**  $n$  Ereignisse  $A_1, \dots, A_n$ , die jeweils mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten; Wie wahrscheinlich ist es, dass alle gleichzeitig eintreten?

# Robustheit der „hohen Wahrscheinlichkeit“

## Definition

Ein Ereignis findet **mit hoher Wahrscheinlichkeit** statt, wenn es mit Wahrscheinlichkeit mindestens  $1 - \frac{1}{n^c}$ , für eine beliebig vorgegebene Konstante  $c \geq 1$ , stattfindet.

→ In der Regel hängt die in der  $O$ -Notation verborgene Konstante von  $c$  ab

**Beispiel:**  $n$  Ereignisse  $A_1, \dots, A_n$ , die jeweils mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten; Wie wahrscheinlich ist es, dass alle gleichzeitig eintreten?

$$\Pr \left[ \bigcap_{i=1}^n A_i \right] = 1 - \Pr \left[ \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i \right]$$

# Robustheit der „hohen Wahrscheinlichkeit“

## Definition

Ein Ereignis findet **mit hoher Wahrscheinlichkeit** statt, wenn es mit Wahrscheinlichkeit mindestens  $1 - \frac{1}{n^c}$ , für eine beliebig vorgegebene Konstante  $c \geq 1$ , stattfindet.

→ In der Regel hängt die in der  $O$ -Notation verborgene Konstante von  $c$  ab

**Beispiel:**  $n$  Ereignisse  $A_1, \dots, A_n$ , die jeweils mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten; Wie wahrscheinlich ist es, dass alle gleichzeitig eintreten?

$$\Pr \left[ \bigcap_{i=1}^n A_i \right] = 1 - \Pr \left[ \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i \right] \geq 1 - \sum_{i=1}^n \Pr[\bar{A}_i]$$

# Robustheit der „hohen Wahrscheinlichkeit“

## Definition

Ein Ereignis findet **mit hoher Wahrscheinlichkeit** statt, wenn es mit Wahrscheinlichkeit mindestens  $1 - \frac{1}{n^c}$ , für eine beliebig vorgegebene Konstante  $c \geq 1$ , stattfindet.

→ In der Regel hängt die in der  $O$ -Notation verborgene Konstante von  $c$  ab

**Beispiel:**  $n$  Ereignisse  $A_1, \dots, A_n$ , die jeweils mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten; Wie wahrscheinlich ist es, dass alle gleichzeitig eintreten?

$$\Pr \left[ \bigcap_{i=1}^n A_i \right] = 1 - \Pr \left[ \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i \right] \geq 1 - \sum_{i=1}^n \Pr[\bar{A}_i] = 1 - \sum_{i=1}^n (1 - \Pr[A_i])$$

# Robustheit der „hohen Wahrscheinlichkeit“

## Definition

Ein Ereignis findet **mit hoher Wahrscheinlichkeit** statt, wenn es mit Wahrscheinlichkeit mindestens  $1 - \frac{1}{n^c}$ , für eine beliebig vorgegebene Konstante  $c \geq 1$ , stattfindet.

→ In der Regel hängt die in der  $O$ -Notation verborgene Konstante von  $c$  ab

**Beispiel:**  $n$  Ereignisse  $A_1, \dots, A_n$ , die jeweils mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten; Wie wahrscheinlich ist es, dass alle gleichzeitig eintreten?

$$\begin{aligned}\Pr\left[\bigcap_{i=1}^n A_i\right] &= 1 - \Pr\left[\bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i\right] \geq 1 - \sum_{i=1}^n \Pr[\bar{A}_i] = 1 - \sum_{i=1}^n (1 - \Pr[A_i]) \\ &\geq 1 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^c} = 1 - \frac{n}{n^c} = 1 - \frac{1}{n^{c-1}}\end{aligned}$$

# Robustheit der „hohen Wahrscheinlichkeit“

## Definition

Ein Ereignis findet **mit hoher Wahrscheinlichkeit** statt, wenn es mit Wahrscheinlichkeit mindestens  $1 - \frac{1}{n^c}$ , für eine beliebig vorgegebene Konstante  $c \geq 1$ , stattfindet.

→ In der Regel hängt die in der  $O$ -Notation verborgene Konstante von  $c$  ab

**Beispiel:**  $n$  Ereignisse  $A_1, \dots, A_n$ , die jeweils mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten; Wie wahrscheinlich ist es, dass alle gleichzeitig eintreten?

$$\begin{aligned}\Pr\left[\bigcap_{i=1}^n A_i\right] &= 1 - \Pr\left[\bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i\right] \geq 1 - \sum_{i=1}^n \Pr[\bar{A}_i] = 1 - \sum_{i=1}^n (1 - \Pr[A_i]) \\ &\geq 1 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^c} = 1 - \frac{n}{n^c} = 1 - \frac{1}{n^{c-1}}\end{aligned}$$

Wenn die Wahrscheinlichkeit für jedes  $A_i$  auf  $1 - \frac{1}{n^{c+1}}$  erhöht werden kann, dann findet  $(\bigcap_{i=1}^n A_i)$  „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ statt.



## **Maximal Independent Set**

- Prototypisches „lokales“ Problem
- Einfache sequentielle Lösung

## Maximal Independent Set

- Prototypisches „lokales“ Problem
- Einfache sequentielle Lösung
- Randomisierter Algorithmus zur „parallelen“ Vergrößerung des MIS ohne Koordination
- Analyse mit typische Werkzeugen randomisierter Algorithmen
- „Idealer“ Algorithmus wird mit beschränkter Bandbreite implementiert

Der Inhalt dieser Vorlesungseinheit basiert zum Teil auf Vorlesungseinheiten von Christoph Lenzen und Roger Wattenhofer.

## Literatur:

- Noga Alon, László Babai, Alon Itai. „A Fast and Simple Randomized Parallel Algorithm for the Maximal Independent Set Problem“. *Journal of Algorithms* 7(4): 567–583 (1986)
- Michael Luby. „A Simple Parallel Algorithm for the Maximal Independent Set Problem“. *SIAM Journal on Computing* 15(4): 1036–1053 (1986)
- Yves Métivier, John Michael Robson, Nasser Saheb-Djahromi, Akka Zemmari. „An optimal bit complexity randomized distributed MIS algorithm“. *Distributed Computing* 23(5–6): 331–340 (2011)